

Link do produktu: <https://superkarma.com.pl/pokusa-rawdietline-kaolin-200-g-p-2768.html>

POKUSA RawDietLine KAOLIN 200 g



Cena	32,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	PS20
Kod EAN	5906874731352
Producent	POKUSA FOR HEALTH

Opis produktu

POKUSA RawDietLine Kaolin - Odtruwanie organizmu, biegunki, naturalny sposób na skuteczne czyszczenie zębów.

Niezbędnik psiej apteczki. Czyści kamień nazębny i zatrzymuje biegunki!

Naturalna biała glina kaolinowa o delikatnej konsystencji wydobywana z głębi ziemi z odpowiednich skał osadowych. Ma działanie oczyszczające, osłonowe, łagodzące podrażnienia jelit i skóry. Stosowana wewnętrznie wspomaga hamowanie biegunek i rozwolnienia, łagodzi podrażnienia jelit, oczyszcza organizm z toksyn, uniemożliwia rozwój patogenów. Podawana w zdekantowanej formie pitnej uzupełnia niedobory krzemu, magnezu, litu, sodu i potasu. Stosowana zewnętrznie w formie okładów, łagodzi podrażnienia skóry, koi po ukąszeniach, odkaża. Doskonale czyści zęby z osadu.

Wskazania:

Wewnętrznie: przeciwbiegunkowo, odtruwająco, oczyszczająco.
Zewnętrznie: w formie pasty do zębów lub okładów na podrażnioną skórę.

Skład: Kaolin 100% (kaolin farmaceutyczny)

Dawkowanie:

Przeciwbiegunkowo:

Masa ciała KAOLIN + WODA

do 5 kg: 1 g – 5 ml

5 – 10 kg: 2 g -10 ml

10 – 20 kg: 4 g – 15 ml

20 – 40 kg: 6 g – 15 ml

od 40 kg : 8 g – 20 ml

Załączona miarka zawiera 1 g produktu.

Odtruwająco – przypisaną masie ciała zwierzęcia dawkę produktu umieścić w szklance(250 ml) świeżej, chłodnej wody, po opadnięciu produktu na dno, podawać w formie pitnej wodę bez osadu. Stosowanie zewnętrzne:

Pasta do zębów – 4 g kaolinu +12 kropel soku z cytryny +10 kropel oleju roślinnego- wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Czyścić zęby gazikiem owiniętym na palcu.

Okłady – kaolin mieszamy z niewielką ilością chłodnej wody do uzyskania średnio gęstej masy. Nakładamy na podrażnioną skórę na minimum 1 godzinę. Okład powinien być cały czas wilgotny.

Podczas przygotowywania gliny nie należy używać metalowych narzędzi.

Dokładną dawkę i czas stosowania powinien określić lekarz weterynarii. Wewnętrznie należy stosować co najmniej 2 godziny po podaniu leków.

Opakowanie: 200 g